Sumagic®

PLANT GROWTH REGULATOR

RÉGULATEUR DE CROISSANCE

FOR COMMERCIAL GREENHOUSE USE ONLY / POUR USAGE EN SERRE SEULEMENT COMMERCIAL

GUARANTEE / GARANTIE:	
UNICONAZOLE-P	0,055%

READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING / LIRE L'ÉTIQUETTE ET LIVRET AVANT L'USAGE

REGISTRATION NUMBER / No. D'HOMOLOGATION: 25781
PEST CONTROL PRODUCTS ACT / LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CAUTION
ATTENTION

POISON

DISTRIBUTED BY:
DISTRIBUÉ PAR:
PLANT PRODUCTS CO. LTD.
314 ORENDA ROAD
BRAMPTON,
ONTARIO L6T 1G1

VALENT U.S.A. Corporation
1333 No. California Blvd.
Suite 600
Walnut Creek, CA 94596
Form 1327-D

PRECAUTIONARY MEASURES

CAUTION

- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
- Avoid contact with eyes, skin and clothing.
- Wash concentrate from skin or eyes immediately.
- Do not inhale fumes. Avoid breathing spray mist. Avoid spray drift.
- After use, wash hands and other exposed skin.
- Remove and wash contaminated clothing before reuse.
- When mixing, loading and applying the product, wear waterproof rain gear (e.g. Tyvek coveralls) with a hood, respirator with an organic chemical cartridge, chemical resistant gloves, goggles and rubber boots.
- Do not reenter treated area within 12 hours of application. If early reentry is required, then wear waterproof rain gear (e.g. Tyvek coveralls), respirator with an organic chemical cartridge, chemical resistant gloves and rubber boots.
- Avoid contamination of ponds, streams, rivers and desirable vegetation.
- Store the container tightly closed and away from seed, feeds, fertilizers, plants and foodstuffs.

FIRST AID

If swallowed: If swallowed give water or milk to drink and call a physician or contact a poison control centre. Consult medical personnel before inducing vomiting. If medical advice cannot be obtained, then take the person and product container to the nearest medical emergency treatment centre or hospital. If person is unconscious do NOT give anything by mouth and do NOT induce vomiting.

If inhaled: If inhaled, remove victim to fresh air. If not breathing, give artificial respiration preferably mouth-to-mouth. Get medical attention or contact a poison control centre.

If in eyes: Flush eyes with plenty of water. Call a physician or a poison control centre if irritation persists.

If on skin: Wash with plenty of soap and water. Get medical attention or contact a poison control centre if irritation persists.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

Note to Physicians: Emergency Information – call 1-800-892-0099.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.

NOTICE TO USER

This control product is to be used only in accordance with the directions on this label. It is an offense under the Pest Control Products Act to use a control product under unsafe conditions.

DIRECTIONS FOR USE

IMPORTANT NOTES

- SUMAGIC is an extremely active plant growth regulator. Extreme caution must be exercised in measuring, diluting and applying SUMAGIC. Excessive doses will result in severe growth retardation and possible adverse effects on flowering, plant appearance and marketability. Avoid spray drift onto non-target species.
- Apply to well-watered, vigorously growing plants. Do not mix with pesticides, fertilizers or adjuvants.

PRECAUTIONS

- FOR GREENHOUSE USE ONLY.
- Do not apply SUMAGIC to any food crops.
- Do not use in greenhouses with soil floors consisting of sand or sandy loam soil.
- Do not reuse soil from plants treated with SUMAGIC.
- Do **NOT** use on cranesbill geranium (*Geranium* spp).
- It is recommended that SUMAGIC be applied during morning or late afternoon hours.
- SUMAGIC retards elongation almost immediately after application. Assessment of rate response can often be made about one week after treatment.
- For Poinsettias and Chrysanthemums only, if response to SUMAGIC is deemed to be inadequate following an initial application within the recommended rate range, a repeat application can be made.
- Differences in plant response to SUMAGIC due to plant surface area in relation to soil surface area are possible.
- Extreme temperatures can influence plant response to SUMAGIC. Within the recommended rate range, a higher rate may be required at higher temperatures than at low temperatures for the same effect.

GENERAL INFORMATION

SUMAGIC Plant Growth Regulator can be used to retard the growth of Poinsettias, Chrysanthemums, Easter Lilies and Geranium and Bedding Plant Species. Dilute with water according to the directions below. Make foliar applications with standard spray equipment. Effective dose is strongly dependent on the application volume. Rates expressed are based on a spray volume of 2 litres applied uniformly to 10 square metres of bench area. Low pressure and larger droplets are recommended for best results.

Plant response to SUMAGIC is strongly influenced by cultural and environmental variables, such as growing media, water/fertilizer management, temperature, light, relative day and night temperatures, growing house composition, and other cultural practices. First time users of SUMAGIC should treat a limited number of plants at the lowest recommended rate. Rates may be adjusted within the recommended rate range as necessary. In particular, temperature can have a significant effect on the response from any given rate. Within the recommended rate range, a higher rate may be required at higher temperatures than at lower temperatures for the same effect.

SUMAGIC Plant Growth Regulator has been tested on a limited range of cultivars. Response to SUMAGIC Plant Growth Regulator has been determined to be influenced by genetic background. Growers should limit first use of SUMAGIC Plant Growth Regulator to a limited number of plants of each cultivar, prior to adoption as a cultural practice under their particular growing conditions.

POINSETTIA

Apply SUMAGIC Plant Growth Regulator as a foliar spray when the breaks are 3.5 to 5.0 cm in length (about 10 to 14 days after pinching). Use a rate of 4 to 16 mL/L (2 to 8 ppm) and apply uniformly at a spray volume of 2 litres per 10 square metres of bench area. Up to two repeat applications can be made at 7 day intervals until the desired growth characteristics are achieved. Bract size and diameter may be slightly reduced with treatment, and days to flowering may be delayed. Late season application (after short-day initiation) may have negative effects on bract size, plant quality and marketability. DO NOT APPLY TO POINSETTIAS AFTER THE INITIATION OF SHORT DAYS.

CHRYSANTHEMUMS

Apply SUMAGIC Plant Growth Regulator as a foliar spray 7 to 14 days after pinching when the length of the breaks is 3.8 to 5.0 cm. Use a rate of 10 to 20 mL/L (5 to 10 ppm) and apply uniformly in a spray volume of 2 litres per 10 square metres of bench area. A single repeat spray can be applied 7 to 21 days after the initial application to increase the level of growth reduction. Two applications may have more effect than the same amount of product applied as a single treatment. Alternatively, a solution of 40 mL/L (20 ppm) can be applied in a spray volume of 2 litres per 10 square metres of bench area, but DO NOT make a repeat application following the 20 ppm spray.

EASTER LILIES

Apply SUMAGIC Plant Growth Regulator as a foliar spray when shoots are 7.5 cm tall. Use a rate of 6 to 60 mL/L (3 to 30 ppm) and apply uniformly in a volume of 2 litres per 10 square metres of bench area. A single repeat spray of 3 to 5 ppm may be applied 2 to 3 weeks after an initial spray of 3 to 5 ppm. DO NOT make a repeat application following a spray of greater than 5 ppm. Avoid late-season application. Insufficient height reduction may result following application of SUMAGIC to “Nellie White” Easter lilies grown under zero or negative DIF (day temperatures the same as or lower than night temperatures).

NOTE: Treatment with SUMAGIC may reduce the water requirement for Easter Lilies.

GERANIUM AND BEDDING PLANT SPECIES

Apply as a foliar spray.

Geranium and Bedding Plant Species for which use of SUMAGIC is Acceptable, with Stated Restrictions.

HOST SPECIES	ACCEPTABLE RATE RANGE (PPM UNICONAZONE-P)*	ACCEPTABLE MAXIMUM NUMBER OF APPLICATIONS**	ACCEPTABLE APPLICATION TIMING***
BEDDING PLANTS			
Celosia (*Celosia plumosa*)	2.5 to 10	Two	5 to 10 cm height
Coleus (*Coleus* sp.)	5 to 10	One	2 to 5 cm height
Impatiens (*Impatiens walleriana* or *I. balsamina*)	2.5 to 10	Two	3 to 10 cm height
Marigold (*Calendula officinalis, Tagetes erectus, T. patula* and *T. signata*	5 to 15	Two	5 to 10 cm height
Pansy (*Viola wittrockiana*)	1 to 6	One; if > 3 ppm was applied Two; both applications of 1 to 3 ppm	3 to 5 cm height
Periwinkle (*Vinca minor*)	1 to 3	Two	5 to 10 cm height
Petunia (*Petunia hybrida*)	10 to 30	One	2 to 5 cm height
Salvia (*Saliva splendens, S. horminum, S. farinacea, S. coccinea* and *S. sclarea*)	1 to 10	Two	3 to 10 cm height
Snapdragon (*Antirrhinum majus*)	10 to 30	One; if >15 ppm was applied Two; both applications of 10 to 15 ppm	5 to 10 cm height
Viola (*V. tricolor, V. cornuta* and *V. williamsii*)	1 to 5	One	2 to 5 cm height
Geranium (Zonal: *Pelargonium hortorum* and Ivy: *Pelargonium peltatum*)	2 to 4 if grown from seed; 2 to 8 if vegetatively propagated	Two	Use 2 to 4 ppm on seed geraniums when plant height is 5 to 16 cm. For vegetatively propagated geranium, apply 2 to 8 ppm to cuttings once rooting is established.

* SUMAGIC is extremely active at very low rates. Growers should be careful to initially use lower rates for younger seedlings. Application may be made by foliar spray only.

** To some crops (as indicated), a second application may be made as required, but no earlier than 7 days after the first application.

*** The application timing proposed was 5 to 16 cm height for all porposed bedding plant species. The application timing shown in this column was supported by the submitted data, however, the applicant and registrant may further restrict the application timing, but only within the accepted application window.

STORAGE AND DISPOSAL

PROHIBITIONS

Do not contaminate water, food or feed by storage, disposal or cleaning of equipment. Open dumping is prohibited.

STORAGE

Keep pesticide in original container. Do no put concentrate or dilute solutions into food or drink container. Store in cool, dry, and well ventilated place away from seed, feed, fertilizer or other pesticides. Do not store diluted spray.

DISPOSAL

1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank.
2. Follow provincial instruction for any required additional cleaning of the container prior to its disposal.
3. Make the empty container unsuitable for further use.
4. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
5. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

NOTICE TO BUYER

Seller's guarantee shall be limited to the terms set out on the label and, subject thereto, the buyer assumes the risk to persons or property arising from the use or handling of this product and accepts the product on that condition.

Copyright© 2001 by Valent U.S.A. Corporation

SUMAGIC is a registered trademark of Valent U.S.A. Corporation.

Plant Products Co. Ltd. is an authorized user of the trademark.

Manufactured for
Valent U.S.A. Corporation
P.O. Box 8025
Walnut Creek, CA 94596-8025

Made in U.S.A.

Form 1327-D

Information contained in this booklet is accurate at the time of printing. Since product testing is a continuous process, please read and follow the directions on the product label for the most current directions and precautionary statements.

Always check with your state to verify state registration status.

For more information call:
1-800-89-VALENT
www.valentpro.com

2001-SUM-0001, CAN 2/01/AV

Sumagic®

PLANT GROWTH REGULATOR
RÉGULATEUR DE CROISSANCE

PRÉCAUTIONS

ATTENTION

- GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- Enlever immédiatement le concentré par lavage de la peau ou des yeux.
- Ne pas respirer les vapeurs. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Éviter la dérive.
- Après l'usage, se laver les mains et toute autre partie du corps exposée.
- Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les rendosser.
- Pendant le mélange, le chargement et l'application du produit, porter des vêtements imperméables (par exemple une combinaison de Tyvek) avec un capuchon, un respirateur avec cartouche filtrante, des gants antiacides, des lunettes protectrices et des bottes en caoutchouc.
- Ne pas pénétrer dans l'aire traitée au cours des 12 heures qui suivent le traitement. Si l'on doit pénétrer dans la zone avant le délai, porter des vêtements imperméables (p. ex., une combinaison de Tyvek), un respirateur avec cartouche filtrante, des gants antiacides et des bottes en caoutchouc.
- Éviter de contaminer les étangs, les cours d'eau, les rivières et la végétation utile.
- Entreposer le contenant fermé hermétiquement loin des semences, du fourrage, des engrais, des plantes et de la nourriture.

PREMIERS SOINS

Ingestion: En cas d'ingestion, donner de l'eau ou du lait à boire et appeler un médecin ou contacter le centre antipoison. Consulter un médecin avant de faire vomir. S'il est impossible d'obtenir un avis médical, amener la victime et le contenant du produit au service d'urgence du centre le plus près ou à l'hôpital. Si la victime est inconsciente, NE RIEN lui administrer par la bouche et NE PAS faire vomir.

Inhalation: En cas d'inhalation, amener la victime à l'air frais. Si elle ne respire pas, lui administrer la respiration artificielle, préférablement de bouche à bouche. Recourir au médecin ou contacter le centre antipoison.

Contact oculaire: Rincer les yeux avec une quantité abondante d'eau. Appeler un médecin ou contacter le centre antipoison si l'irritation persiste.

Contact cutané: Laver avec une quantité abondante d'eau savonneuse. Recourir au médecin ou contacter le centre antipoison si l'irritation persiste.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

Note pour le médecin: Renseignements d'urgence: composez le 1-800-892-0099.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

MODE D'EMPLOI

REMARQUES IMPORTANTES

- SUMAGIC est un régulateur de croissance extrêmement actif. Prendre des précautions exceptionnelles lorsqu'on mesure, dilue ou applique SUMAGIC. Une dose excessive du produit cause un important ralentissement de la croissance et des effets défavorables possibles sur la floraison, l'apparence de la plante et sa commercialibilité. Éviter la dérive sur les espèces non ciblées.
- Appliquer sur des plants en pleine croissance et bien arrosés. Ne pas mélanger avec des pesticides, des engrais ou des adjuvants.

PRÉCAUTIONS

- POUR USAGE EN SERRE SEULEMENT
- Ne pas appliquer SUMAGIC sur aucune culture vivrière.
- Ne pas utiliser dans une serre lorsque le plancher est de sable ou de sable limoneux.
- Ne pas réutiliser la terre des plantes traitées avec SUMAGIC.
- Ne **PAS** utiliser sur les géraniums de Bickell (*Geranium* spp).
- On recommande d'appliquer SUMAGIC le matin ou tard l'après-midi.
- SUMAGIC retarde l'allongement presqu'immédiatement après l'application. On peut souvent évaluer l'efficacité environ une semaine après le traitement.
- Pour les poinsettias et les chrysanthèmes seulement, si la réponse au SUMAGIC est inefficace après la première application dans les limites de la dose recommandée, répéter le traitement.
- Il est possible que les plantes réagissent différemment au SUMAGIC, attribuable à la surface de la plante en rapport avec la surface du sol.
- Les températures extrêmes peuvent influencer la réaction des plantes à SUMAGIC. Dans les limites de la dose recommandée, il peut être nécessaire d'utiliser une dose plus forte lorsqu'il fait chaud que lorsque la température est basse.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

On peut utiliser le régulateur de croissance SUMAGIC pour retarder la croissance des poinsettias, des chrysanthèmes, des lis de Pâques, et espèces de géraniums et de plantes à massif. Diluer dans l'eau selon le mode d'emploi ci-dessous. Faire un traitement foliaire au moyen d'un pulvérisateur ordinaire. La dose efficace dépend grandement du volume d'application. Les doses recommandées se fondent sur un volume d'arrosage de 2 litres appliqué uniformément sur 10 mètres carrés de bâche. Pour de meilleurs résultats, on recommande une basse pression et de grosses gouttelettes.

La réaction des plantes au SUMAGIC dépend grandement des facteurs culturaux et environnementaux, notamment le milieu de croissance, la gestion de l'eau / de l'engrais, la température, la lumière, les températurers relatives du jour et de la nuit, la composition de la serre, et d'autres pratiques culturales. Les personnes qui utilisent SUMAGIC pour la première fois doivent traiter un petit nombre de plants à la plus faible dose recommandée et modifier ensuite la dose au besoin dans les limites des doses recommandées. En particulier, la température peut avoir un effet important sur la réaction à toutes les doses. Dans les limites de la dose recommandée, il peut être nécessaire d'utiliser une dose plus forte lorsqu'il fait chaud que lorsque la température est basse.

Des essais avec le régulateur de croissance SUMAGIC ont été entrepris sur un nombre limité de cultivars. On a déterminé que la réaction au régulateur de croissance SUMAGIC est influencée par les antécédents génétiques. Les producteurs doivent limiter le premier usage du régulateur de croissance SUMAGIC à un nombre restreint de plants de chaque cultivar, avant d'adopter une pratique culturale selon les conditions particulières de croissance.

POINSETTIA

Appliquer le régulateur de croissance SUMAGIC en pulvérisation foliaire lorsque les boutures atteignent 3,5 à 5,0 cm de longueur (environ 10 à 14 jours après le pincement). Utiliser 4 à 16 mL/L (2 à 8 ppm) et appliquer uniformément un volume d'arrosage de 2 litres par 10 mètres carrés de bâche. On peut effectuer jusqu'à deux nouveaux traitements à intervalles de 7 jours jusqu'à l'obtention des caractéristiques de croissance voulues. Le traitement peut diminuer faiblement la taille et le diamètre des bractées, de sorte que le nombre de jours à la floraison peut être retardé. Un traitement tard en saison (après le début des journées courtes) peut avoir des effets négatifs sur la taille des bractées, la qualité des plants et la commerciabilité. NE PAS APPLIQUER SUR DES POINSETTIAS APRÈS LE DÉBUT DES JOURNÉES COURTES.

CHRYSANTHÈMES

Appliquer le régulateur de croissance SUMAGIC en traitement foliaire 7 à 14 jours après le pincement, lorsque les boutures atteignent 3,8 à 5 cm de hauteur. Utiliser 10 à 20 mL/L (5 à 10 ppm) et appliquer uniformément un volume d'arrosage de 2 litres par 10 mètres carrés de bâche. On peut effectuer un autre traitement 7 à 21 jours après la première application pour augmenter le taux de l'inhibition de la croissance. Deux applications peuvent être plus efficaces que la même quantité de produit appliqué dans un seul traitement. Alternativement, on peut appliquer une solution de 40 mL/L (20 ppm) dans un volume d'arrosage de 2 litres par 10 mètres carrés de bâche, mais NE PAS répéter le traitement après une pulvérisation de 20 ppm.

LIS DE PÂQUES

Appliquer le régulateur de croissance SUMAGIC en traitement foliaire lorsque les pousses atteignent 7,5 cm de hauteur. Utiliser 6 à 60 mL/L (3 à 30 ppm) et appliquer uniformément un volume de 2 litres par 10 mètres carrés de bâche. On peut effectuer un autre traitement de 3 à 5 ppm 2 à 3 semaines après le premier traitement de 3 à 5 ppm. NE PAS faire d'autres traitements après une pulvérisation de plus de 5 ppm. Éviter de traiter en fin de la saison. On n'atteindra pas la hauteur voulue après une application de SUMAGIC sur les lis de Pâques <<Nellie White>> cultivés selon un DIF de zéro ou négatif (les températures pendant le jour sont les mêmes ou plus basses que les températures pendant la nuit).

REMARQUE: Le traitement avec SUMAGIC peut diminuer la quantité d'eau nécessaire dans les lis de Pâques.

ESPÈCES DE GÉRANIUMS ET DE PLANTES À MASSIF

Appliquer en pulvérisation foliaire.

Espèces de géraniums et de plantes à massif pour lesquelles SUMAGIC est acceptable, avec mention des restrictions.

ESPÈCES-HÔTES	DOSE ACCEPTABLE (PPM UNICONAZOLE-P)*	NOMBRE MAXIMAL D'APPLICATIONS ACCEPTABLES**	TEMPS ACCEPTABLE POUR APPLIQUER***
PLANTES À MASSIF			
Célosie (*Celosia plumosa*)	2,5 à 10	Deux	5 à 10 cm de hauteur
Coléus (*Coleus* spp.)	5 à 10	Une	2 à 5 cm de hauteur
Impatiens (*Impatiens walleriana ou I. balsamina*)	2,5 à 10	Deux	3 à 10 cm de hauteur
Tagète (*Calendula officinalis, Tagetes erectus, T. patula*, et *T. signata*)	5 à 15	Deux	5 à 10 cm de hauteur
Pensée (*Viola wittrockiana*)	1 à 6	Une; si >3 ppm a été appliqué. Deux; les deux applications de 1 à 3 ppm.	3 à 5 cm de hauteur
Pervenche (*Vinca minor*)	1 à 3	Deux	5 à 10 cm de hauteur
Pétunia (*Petunia hybrida*)	10 à 30	Une	2 à 5 cm de hauteur
Sauge (*Salvia splendens, S. horminum, S. farinacea, S. coccinea*, et *S. sclares*)	1 à 10	Deux	3 à 10 cm de hauteur
Muflier des jardins (*Antirhinum majus*)	10 à 30	Une; si >15 ppm a été appliqué. Deux; les deux applications de 10 à 15 ppm.	5 à 10 cm de hauteur
Violette (*V. tricolor, V. cornuta*, et *V. williamsii*)	1 à 5	Une	2 à 5 cm de hauteur
Géranium (Zonal: *Pelargonium hortorum*, et Lierre: *Pelargonium peltatum*)	2 à 4 si cultivées pour semence; 2 à 8 si reproduction végétative	Deux	Utiliser 2 à 4 pp sur les géraniums de semence lorsque les plants atteignent 5 à 16 cm de hauteur. Pour les géraniums de reproduction végétative, appliquer 2 à 8 ppm sur les boutures après que les racines sont établies.

* SUMAGIC est extrêmement actif à très faibles doses. Les producteurs doivent faire attention de commencer par de faibles doses sur les jeunes pousses. N'appliquer qu'en pulvérisation foliaire.

** Pour certaines cultures (tel qu'indiqué), on peut faire un deuxième traitement au besoin, mais il faut attendre 7 jours après le premier traitement.

*** Le temps propice au traitement était 5 à 16 cm de hauteur pour toutes les espèces de plantes à massif. Le temps recommandé dans cette colonne est fondé sur des données soumises. Cependant, le producteur ou détenteur d'homologation pourra restreindre davantage le temps d'application, mais seulement à l'intérieur de la fenêtre acceptable d'application.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

PROHIBITIONS

Ne pas contaminer l'eau, la nourriture ou le fourrage pendant l'entreposage, l'élimination ou le nettoyage de l'équipement. Le versage brut est interdit.

ENTREPOSAGE

Conserver les pesticides dans leur contenant d'origine. Ne pas entreposer ou diluer la solution dans un contenant de nourriture ou de boisson. Entreposer dans un endroit frais et sec, bien aéré et à l'ecart des semences, du fourrage, des engrais ou autres pesticides. Ne pas entreposer le produit dilué.

ELIMINATION

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Eliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'ACHETEUR

La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette, de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner, et accepte celui-ci à cette condition.

SUMAGIC est une marque déposée de Valent U.S.A. Corporation.

Plant Products Co., Ltd. est une utilisateur autorisé de la marque.

Formulaire 1327-D

Manufactured for
Valent U.S.A. Corporation
P.O. Box 8025
Walnut Creek, CA 94596-8025

Made in U.S.A.

Information contained in this booklet is accurate at the time of printing. Since product testing is a continuous process, please read and follow the directions on the product label for the most current directions and precautionary statements.

Always check with your state to verify state registration status.
For more information call:
1-800-89-VALENT
www.valentpro.com

2001-SUM-0001, CAN 2/01/AV